

NOTICE

SEPTILAIT[®]
Irgasan DP 300

COMPOSITION

Irgasan DP 300.....0,3 g
Excipients q.s.p.100 ml

PROPRIETES

Solution antiseptique moussante, bactéricide et fongicide.

INDICATIONS

*En Médecine Générale :

- Hémorroïdes
- Brûlures
- Mycoses
- Inflammation et irritation dues aux produits de nettoyage

*En Pédiatrie

- Bain de bébé
- Vaginites et Prurits vulvaires des nourrissons et bébés
- Activité sportive : pour les enfants qui fréquentent les piscines publiques

*En Gynécologie et urologie

- Prurit anal et vulvaire
- En prévention et comme coadjuvant dans la thérapie du Trichomonas et *Candida albicans*.
- Cystites et urétrites

CONTRE-INDICATIONS

Sensibilité à l'un des composants (ou sensibilité au groupe).

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Ce produit s'utilise pur ou dilué en application locale suivie d'un rinçage.

*Pour l'hygiène intime externe : verser le contenu d'un bouchon dans $\frac{3}{4}$ de litre d'eau tiède.

Prolonger la toilette pendant 3 à 4 minutes.

*Pour le bain : verser les $\frac{3}{4}$ d'un bouchon dans l'eau du bain.

*Pour la douche : verser sur un gant de toilette mouillé le contenu d'un bouchon et se frictionner le corps.

FORME ET PRESENTATION

Solution à usage externe - Flacon de 125 ml.

Solution à usage externe - Flacon de 250 ml.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conserver à une température inférieure à 30°C

SEPTILAIT[®], Flacon de 125 ml

A.M.M. : n° E-2005- 218

SEPTILAIT[®], Flacon de 250 ml

A.M.M. : n° E-2008-086

Vente libre

Laboratoires OLEA

25 BP 276 ABIDJAN 25

SEPTILAIT®
Irgasan DP 300

COMPOSITION

Irgasan DP 300.....0.3 g
Excipients s.q.f.100 ml

PROPERTIES:

Antiseptic lathering solution having bactericidal and fungicidal activity.

INDICATIONS

* In General Practice

- Hemorrhoids
- Burns
- Mycosis
- Inflammation and irritation caused by cleaning products

* In Pediatrics

- Baby bath
- Vaginitis and vulvar itching of infants and babies
- Sports activity: for children attending public pools

* In Gynecology and Urology

- Anal and vulvar pruritus
- For prevention and as co-adjuvant in the therapy against *Trichomonas* and *Candida albicans*
- Cystitis and urethritis

CONTRA-INDICATIONS

Sensitivity to any component (or sensitivity to the group)

DOSAGE AND MODE OF USE

This medicine must be used pure or diluted in local application followed by rinsing.

* For external intimate hygiene: pour the content of a plug in $\frac{3}{4}$ of a liter of warm water. Extend the toilet for 3 to 4 minutes.

* For bathing: pour $\frac{3}{4}$ of a plug in the bath water.

* For showering: pour over a wet washcloth the content of a cap and rub the body.

FORM AND PRESENTATION

Solution for external use - 125 ml bottle.

Solution for external use - 250 ml bottle.

STORING CONDITIONS

Store below 30°C

SEPTILAIT®, 125 ml bottle. **A.M.M. : n° E-2005- 218**

SEPTILAIT®, 250 ml bottle **A.M.M. : n° E-2008-086**

OTC drug

Laboratoires OLEA

25 BP 276 ABIDJAN 25